

NOTAS COMPLEMENTARES À DESCRIÇÃO DE *Sclerolobium reticulosum* DWYER, UMA NOVA OCORRÊNCIA PARA O ESTADO DO PARÁ

Maria da Graça Albuquerque Lobo¹

RESUMO — O trabalho apresenta uma complementação à descrição de *Sclerolobium reticulosum* Dwyer; com desenhos da espécie, dando ênfase às estruturas florais. A espécie é aqui citada pela primeira vez para o Estado do Pará, sendo que antes era assinalada apenas para a Amazônia venezuelana e Estado do Amazonas (Brasil).

PALAVRAS—CHAVE: *Sclerolobium*, Leguminosae—Caesalpinioideae, Taxonomia.

ABSTRACT — This paper offers a complement to the description of *Sclerolobium reticulosum* Dwyer, along with drawings of the species; special emphasis is given to its floristic structures. This species is now cited for the first time in the State of Pará, whereas before it had been referred to just for the Venezuelan Amazon and for the State of Amazonas (Brazil).

KEY WORDS: *Sclerolobium*, Leguminosae—Caesalpinioideae, Taxonomy.

INTRODUÇÃO

A contribuição que ora apresentamos visa complementar a diagnose da espécie *Sclerolobium reticulosum* Dwyer (l.c.), publicada por Dwyer (1957) que, por falta de material florífero, não a descreveu por completo. Como recentemente obtivemos material coletado em uma de nossas excursões no Estado do Pará, o qual estava sem identificação específica, verificamos a literatura especializada, conjuntamente com o exame do material, chegando à conclusão de que se trata da espécie acima citada.

¹ SCT/CNPq/Museu Paraense Emílio Goeldi — Depto. de Botânica.

Achamos por bem complementar o trabalho de Dwyer, apresentando outros detalhes como desenhos florais, os quais não constam da descrição original, contribuindo para uma melhor identificação da espécie, principalmente nos trabalhos de inventário florestal e em uma eventual revisão do gênero (que engloba as espécies conhecidas vulgarmente como "Tachi").

RESULTADO

Sclerolobium reticulosum Dwyer, Lloydia, 20(2):98, 1957. (Figuras 1, 2).

Árvore de 28 m de altura; ramos pubescentes, estriados, folhas compostas, alternas, paripenadas, acima de 9 cm de comprimento; pecíolo 2,0 — 3,5 cm de comprimento, puberulento, canaliculado em ambos os lados; pecíolo 1,0 — 2,0 mm de comprimento, puberulento; estípula 1,9 mm de comprimento. Folíolos 5 a 9 jugos; limbo 2,0 — 10,0 cm de comprimento, 0,8 — 2,8 cm de largura, assimétrico, coriáceo, oblongo—lanceolado, ápice acuminado, base obtusa, face adaxial glabra e glabrescente e abaxial puberulenta a glabrescente, principalmente nas nervuras principal e secundárias; superfície reticulada. Nervuras secundárias, 10 — 13 pares, conspicuas na face abaxial. Inflorescência, racemo; flores pequenas, amarelas, ca. de 3,5 mm; pedicelo 1,0 — 2,0 mm de comprimento, puberulento; hipanto 0,5 — 1,0 mm de comprimento, puberulento; sépalas (5), de 1,1 — 1,8 mm de comprimento, 1,0 — 1,9 mm de largura, obovadas a suborbiculares, glabras a glabrescentes internamente e puberulentas externamente na base; pétalas (5) de 1,1 — 1,5 mm de comprimento, 0,3 — 0,8 mm de largura, ligeiramente unguiculadas, glabras externamente e internamente com pêlos brilhosos acima de 0,3 mm comprimento, esparsos na base. Estames, 10, alturas diferentes; filete filiforme subulado, 2,0 — 3,8 mm de comprimento; com pêlos brilhosos na parte interna (em 2/3 do filete); antera globosa, menor que 0,5 mm. Ovário, 1,5 mm de comprimento, piloso somente nas partes ventral e dorsal, 6 — 7 óvulos; estípite, 1,1 — 1,5 mm de comprimento, glabro; fruto não visto.

MATERIAL EXAMINADO: Brasil, Pará, Santarém; margem direita do rio Curuauna, Reserva Florestal do Curuauna (SUDAM), localidade Barreirinha; Carlos Rosário & Mário R. dos Santos, 832, 10/08/88 (MG, no. 131.001).

Sclerolobium reticulosum estava antes assinalada apenas para a Amazônia venezuelana e Estado do Amazonas. Portanto, este é o primeiro registro de sua ocorrência para o Estado do Pará.

AGRADECIMENTOS

Ao Sr. Carlos Rosário, pela amostra do material botânico; ao colega Ricardo Secco, pelas críticas e sugestões e a Suely Anderson, pela ajuda na elaboração do Abstract.

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

DWYER, J.D. 1957. The Tropical American Genus *Sclerolobium* Vogel (Caesalpiniaceae). *Lloydia*, 20(2):67—118.

Recebido em 29.06.89

Aprovado em 17.05.90






Figura 1 — A- Ramo Florífero, B- Flor.



Figura 2 — Peças Florais. A- Sépalas, B- Pétalas, C- Estame, D- Gineceu, E- Estípula.